|.- 9' / 8² + 1

¹ * flypo*™se vanPrandtl Bakhmeteff.

v--±L£ 19 In A , Indien

~±|[-91n ^ ^In ^° 7 , Z- £, indien
^ / *u. »- y

2< 9 In 55

2. Hypothesevan deoonstantemengweg.

* 3 ed+e-)*

3. Rypotherievan deparaboliachemengweg

X - 3L + 1-In 4 £₀⁻ * bgtan X / 9 6

1/ = - ftflnfAf ⁶ 1 2 +2 (bgtan L, -bgtan indien / 5if

' ' ^ T ^ ⁶ ^ — +ᶻ ᴹ & ᴹ t ʲ ^ ¹ H i ^ bgtan ^/indien / 9

9c fein ⁴ᴱ ⁾ ° - 2 bgtan O/

L/aea j 1//

4-. Hypothesevan delineaire mengweg

9Vz 3 9(1 + 9')

v*-±*[-2(8-U) + 9*i lii ilii / £ = indien ^ £ , ₀

V*±£[z(9*iJ-9(\u*%« *2 bgtani ;/ Z indien 4
* ⁴ Z% 9 ᴶ

v-2lM-zi,+6(lnt£o+2+zhgt*n£hlikllh IZ^L] I indien'k4 £,

«-±£ £^In|i§ -2;

5₀ Hypothesevan desuperpositie,

.rein i ^ ^ i n ^-^₀;7

in Val/ sec.

- SO	80
- 70	70
- 6O	60
— SO	50 —
AO	4.0
30	30 - I

O,A